



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین

دانشکده دندانپزشکی

«پایان نامه»

برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

موضوع:

بررسی شیوع شکاف لب همراه یا بدون شکاف کام در  
شهرستان قزوین و بررسی اتیولوژی این ناهنجاری در  
مراجعین به دانشکده دندانپزشکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین تفضلی شادپور

نقارش:

علی اصغر شهریاری

شماره پایان نامه: ۴۵

سال تحصیلی: ۷۷-۱۳۷۶

### خلاصه:

شکاف لب همراه یا بدون شکاف کام، نوعی ناهنجاری مادرزادی کرانیوفاسیال است که بشر از گذشته های دور با آن درگیر بوده است و درمان هم شامل، پیشگیری و جراحی و استفاده از پروتزهای مختلف است. در مجموع باید گفت که درمان آن تیمی است.

هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع این ناهنجاری در متولدین بیمارستانهای مختلف شهر قزوین و هم چنین بررسی اتیولوژی این بیماری در مبتلایان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قزوین می باشد با توجه به نبودن سازمان مستقل جهت رسیدگی به چنین بیمارانی و اهمیت درمان آن برای خود فرد و والدین آنها از لحاظ روانی، اجتماعی، گفتاری و تغذیه ای ارزش این تحقیق مشخص می شود.

بطور خلاصه باید گفت که جمع آوری اطلاعات از طریق مراجعه به بایگانی بیمارستانها و پرونده های موجود در دانشکده انجام شد.

نتایجی که بدست آمد به شرح زیر می باشد:

- میزان شیوع اختلاف فاحشی با آمار جهانی نداشت [به نسبت  $\frac{1/07}{1000}$ ]
- شکاف لب و کام بیشترین و شکاف کام کمترین تعداد مبتلایان را تشکیل می داد.
- شروع درگیری جنس مذکر بیشتر از جنس مونث بود.
- وجود ناهنجاری همراه شکاف لب و کام در ۱۷/۷٪ موارد بوده است.
- مصرف دارو توسط مادران در زمان بارداری در ۲۴/۴٪ مبتلایان وجود داشت.
- مصرف دارو توسط مادران در زمان بارداری در ۲۴/۴٪ وجود داشت.
- مصرف دخانیات مادران در حین بارداری، در هیچ یک از مادران ملاحظه نگردید.
- هیچک از مادران در حین بارداری اشعه دریاف نکرده بودند.
- نسبت فامیلی در ۲۸/۸٪ والدین مبتلایان مشاهده گردید که بیشترین نسبت دختر دایی پسر عمه بوده، که این خود می تواند از عوامل مؤثر در پیدایش این ناهنجاری باشد.
- درگیری بیشتر شامل فرزندان اول بوده و از بین فرزندان دوم و دوم به بعد (۲۳ نفر)، ۲ مورد بوده که فرزند قبلی بیماری یا ناهنجاری داشته است، که غیر از شکاف کام و لب بوده اند.